

マッサージピール 同意書

PRX-T33 という高濃度トリクロロ酢酸 (TCA) と低濃度過酸化水素 (H2O2) 、コウジ酸を配合したピーリング剤を使用するピーリングです。高濃度 TCA が真皮深層まで強力にアプローチしながら、H2O2 が表皮を保護することで皮膚の剥離を起こしにくいです。TCA は真皮の線維芽細胞増殖因子を活性化させコラーゲン新生を行い、肌ハリを出します。さらにコウジ酸によるシミやくすみの改善、美白効果が期待できます。

- ・ 施術中は火照り感やピリピリとした刺激を感じることがあります。施術後、数日程度、軽度の赤みや皮剥けが起きることがあります。
- ・ 体質によって、稀に軽度の腫れや色素沈着を起こす可能性があります。
- ・ 施術後の皮膚は敏感となっていますので、アルコール成分入りのスキンケア・スクラブ剤などのご使用はお控え頂き、マッサージなどの摩擦や刺激をお肌に与えないように注意してください。
- ・ 古くなった角質がポロポロと剥がれてくることがあります。無理に剥がしたり、強くこすったりしないで下さい。
- ・ 施術後は乾燥しやすい状態となっておりますので保湿はこまめに行ってください。また日焼け止めを使用して紫外線対策を十分に行い、日焼けは避けて下さい。
- ・ ニキビ治療でピーリング効果のある製剤を使用されている方、グリコール酸、サリチル酸、トレチノインやレチノール、ハイドロキノンなどを使用されている方は刺激が出やすいことがあるので、施術の1週間程前より使用を控えて下さい。気になる方はお肌状態を拝見させていただきますのでお申し出ください。
- ・ トレチノイン・ハイドロキノン・レチノールを使用されている方は、施術後の赤みやひりつきなどの反応がおさまるまで使用を控えてください。
- ・ 妊娠中・授乳中の方、コウジ酸アレルギーの方の施術は控えていただいております。
- ・ 下記に該当される方は、治療を控えていただく場合がありますので事前にお申し出ください。
重度の敏感肌の方、
皮膚に強い炎症(アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、かぶれ等)や悪性腫瘍がある方、
ヘルペス治療中の方、日焼け後の色素沈着、炎症が強い方

マッサージピールの効果をより高めるためにフェイスフルイドでのホームケアを推奨しています。

私は上記内容を理解し、施術に同意します。

○本人(20歳未満の場合は法定代理人欄の両方に署名が必要です)

令和 年 月 日 氏名

○法定代理人(親権者・後見人・保護義務者)あるいは保証人

令和 年 月 日 氏名

(続柄)

よつば会クリニック 京都院