

高濃度ビタミンC点滴 同意書

1. 以下のものに該当する場合は投与できない可能性がありますので、必ず事前に申告して下さい。
ビタミンCに対するアレルギー・過敏症、G6PD欠乏症、鉄過敏症、心不全、腎不全、
腎結石症、糖尿病、抗がん剤との併用、授乳中
※妊娠中の方のお施術はご案内お断りしております。
2. 施術により、下記の症状が起こる場合があります。
穿刺部位の腫れ・内出血、発疹、腫れ、むくみ、痒み、蕁麻疹、頭痛、筋肉痛、発熱
倦怠感、冷や汗、アナフィラキシーショック、感染症
3. 高濃度ビタミンC【フル】点滴を希望される際は必ず血液検査を受けて頂きます。
G6PDという酵素が欠損している遺伝性疾患の方が、高濃度のビタミンCを投与すると溶血することがあります。検査結果到着には1週間程度かかります。
※既に他院でG6PD検査をされたことがある方は、G6PDの値が確認できる検査結果をお持ち頂ければ
当クリニックでの採血は必要ありません。
4. 実施中に緊急又は予想外の処置が必要な場合には、適宜処置をさせていただきます。
しかし、専門的な検査・治療を要する際の移送やそこでの検査・治療等に関わる一切の費用に関して当
クリニックは責任を負いません。
5. 血管内に直接投与するため、美容成分が体全体に浸透します。しかし、摂取後すぐに効果が実感できる
わけではありませんので継続的な治療をおすすめします。
6. 注意事項
 - (1)点滴投与中の刺入部あるいは周囲の痛み、吐き気や頭痛
浸透圧や投与速度、血管の状態により痛みを感じることがあります。投与速度で調整することで軽減
することができますので、症状が強い時はお申し出下さい。
 - (2)眠気
ビタミンCの抗ヒスタミン作用によるのもであり、一時的な症状ですので心配ありません。
 - (3)口渴
高濃度ビタミンCを投与すると脱水を生じることがあります。
点滴投与前に水分を十分に摂取して頂き、投与中にも適宜摂取して頂くことをおすすめします。
 - (4)その他
 - ・空腹で高濃度ビタミンCを投与すると気分が悪くなる場合があります。
 - ・喫煙はビタミンCの血中濃度が十分に上がらない原因となります。
 - ・点滴投与には【ハーフ】20分程度【フル】40分程度を要するため予めお手洗いを済ませ
下さい。

私は上記内容を理解し、施術に同意します。

○本人(18歳未満の場合は法定代理人欄の両方に署名が必要です)

令和 年 月 日 氏名

○法定代理人(親権者・後見人・保護義務者)あるいは保証人

令和 年 月 日 氏名

(続柄)

よつば会クリニック 京都院